



本品与多种药物、疫苗同时使用时，其作用在多数情况下均能同时达到预期目的，但应密切注意其相互作用。

【不良反应】

(1) 皮肤及其附件损害：皮疹、荨麻疹、过敏性皮炎等。

(2) 神经系统损害：癫痫发作、无菌性脑膜炎等。

(3) 呼吸系统损害：急性呼吸窘迫综合征、肺水肿、支气管痉挛等。

(4) 循环系统损害：低血压、心动过速、心律失常等。

(5) 血液系统损害：血小板减少、溶血反应等。

(6) 泌尿系统损害：肾功能损害等。

(7) 其他：发热、寒战、头痛、乏力、恶心、呕吐、腹泻、便秘、腹痛、肌肉疼痛、关节痛、淋巴结肿大、甲状腺炎、胰腺炎、间质性肺炎、过敏性休克等。

【禁忌】

对本品或任何成分过敏者禁用。

【慎用】

1. 有自身免疫性疾病者慎用。

2. 有严重过敏反应者慎用。

3. 有严重肾功能损害者慎用。

4. 有严重肝功能损害者慎用。

5. 有严重电解质紊乱者慎用。

6. 有严重心血管疾病者慎用。

7. 有严重呼吸系统疾病者慎用。

8. 有严重神经系统疾病者慎用。

9. 有严重血液系统疾病者慎用。

10. 有严重泌尿系统疾病者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品在动物实验中未见致畸作用，但在人类中尚无足够的数据。因此，本品在怀孕期间应谨慎使用。哺乳期妇女使用本品时，应密切观察婴儿的不良反应。

【儿童用药】

本品在儿童中的安全性和有效性尚未得到充分证实。因此，本品在儿童中应谨慎使用。

【老年患者用药】

本品在老年患者中的安全性和有效性尚未得到充分证实。因此，本品在老年患者中应谨慎使用。

【药物相互作用】

本品尚无与其它药物相互作用的临床研究资料。因此本品应严格单独给药，不得与其他任何药物混合使用。如必须联合用药，应在医生的指导下进行。

【药物过量】

本品尚无过量给药的临床研究资料。本品过量可能导致患者出现循环系统衰竭和血液系统损害等严重不良反应。因此，本品应严格按照说明书的剂量使用。

【药理毒理】

本品为一种广谱抗菌药，对多种细菌具有抑制作用。其作用机制是通过干扰细菌的蛋白质合成，从而达到杀菌的目的。

【药代动力学】

本品目前尚无体内外药代动力学的临床研究资料。本品为水溶性药物，口服后吸收迅速，分布广泛。

【规格】

0.5g/瓶

【包装】

铝塑包装

【有效期】

36个月

【贮藏】

密封，避光，干燥处保存。

【批准文号】

国药准字S20000000

【生产企业】

企业名称：博时生物制药有限公司
生产地址：石家庄市高新区
邮政编码：050200
电话号码：0311-63935518